




Растительный и животный мир Кубани

Составитель - И.И.Сербина

Природные особенности Краснодарского края



ОПАСНЫЕ МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ КРАЯ

Тригла или морской петух

Тригла (*Trigla* - это другое название морского петуха) очень отдаленно напоминает всем знакомую птицу. Но, надо признать, она обладает многими интересными качествами, и название этой рыбы было выбрано не зря. Она может издавать разнообразные звуки – древние ученые даже прозвали ее морской кукушкой.



Медуза - корнерот

Медуза корнерот (*Rhizostoma pulmo*) - самая крупная медуза Черного и Средиземного морей. Медуза принадлежит к отряду Корнероты (лат. *Rhizostomeae*) и может достигать 50-60 см в диаметре и весить 10 кг.



Морской дракончик

Морской дракон (лат. *Trachinus draco*) — это хищная донная рыба с большой головой и слегка сжатым по бокам, удлинённым телом около 25-35 см. Спина дракончика желто-коричневого цвета с темными полосками, а брюшко светлое. Нижняя челюсть длиннее верхней, рот с мелкими острыми зубами. Выпуклые глаза располагаются на верхней стороне головы. Тело покрыто мелкой чешуей. На жабрах несколько крупных косых шипов. Спинной плавник с большими колючками.



Скат - хвостокол

Этот скат имеет до 70 см в длину (бывают особи и больше, но не в Черном море). Живут они на дне, на дне же и находят себе пищу – мелких донных рыбок, ракообразных, моллюсков, поэтому рот у них расположен снизу и имеет плоские зубы, которыми он способен раздробить раковины. Скат имеет плоскую и широкую форму, глаза и жабры расположены сверху. Окрас у него преимущественно серый или бурый, нижняя часть белого цвета. Тело ската гладкое без шипиков, но имеется длинный хвост с шипом.



Скорпена

Черноморская скорпена (от лат. *Scorpaena porcus*) – хищная рыба, обитающая в Средиземном и Черном морях, а также у африканского и европейского берегов Атлантического океана. Иногда попадает в Азовском море. Второе название рыбы - «черноморский ерш». Сплюснутая голова скорпены занимает одну треть тела.



ОПАСНЫЕ ЖИВОТНЫЕ СУШИ

Эскулапов полоз

Это одна из крупнейших змей Европы, достигающая в длину более 1,5 м. Сверху она окрашена в черный или серый цвет, с сетчатым рисунком; брюшная сторона белая или желтая, с мелкими темными пятнышками. Голова однотонная, от глаза к уголку рта тянется узкая черная полоска. Молодые особи, в отличие от взрослых, украшены рисунком вдоль тела проходят четыре ряда темных пятен, на шее и затылке поперечная полоска, изогнутая в виде римской цифры V.



Оливковый полоз

Длина оливкового полоза редко превышает одного метра. У него очень длинный хвост, иногда даже равный длине туловища. Тело тонкое, покрытое гладкой чешуей. Головка маленькая с очень крупными глазами.

Верхняя сторона тела — оливковая, серая; ближе к хвосту окраска светлеет. У молодых змей на боках шеи и передней трети туловища располагаются отчетливые бурые, зеленые или почти черные пятна с желтоватой каемкой. По направлению к хвосту они постепенно уменьшаются и теряют окантовку. С возрастом эти пятна светлеют или вообще исчезают. Голова сверху одноцветная или с темными пятнышками. Впереди и позади глаз всегда имеются светлые вертикальные полосы.



Желтобрюхий полоз

Желтобрюхий полоз относится к стройным полозам. В фауне России известны пять видов этого рода. Это — быстро ползающие наземные змеи с изящным туловищем и относительно длинным хвостом. У них четко отграниченная от тела голова, большие глаза с круглым зрачком. И на охоте, и при защите от врагов они полагаются на свое великолепное зрение, быструю реакцию и высокую скорость передвижения. Желтобрюхий полоз достигает двухметрового размера, а рекордные экземпляры превышают два с половиной метра, при этом длина хвоста занимает примерно треть общей длины.



Четырехполосый полоз

Достигает в длину 2 м. и в ширину- 5-6 см. Голова слабо отграничена от туловища шейным перехватом. Боковые чешуи гладкие, а спинные со слабовыраженными ребрышками и двумя апикальными опорами. Брюшные щитки по бокам брюха не образуют заметного ребра. Окраска верха тела очень изменчива. Обычный полосатый рисунок характерен для молодых особей.



ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ КРАЯ

Ясенец кавказский

- многолетнее растение высотой 25—30 и до 60—80 см. Семейство рутовые. Цветет ясенец в июне – июле. Растет в лесах, кустарниках, а чаще в открытой степи на юге страны, больше на Кавказе. В жаркие дни пары эфирного масла выделяются в воздух, вспыхивают при зажигании, обдавая куст синеватым пламенем. Прикосновение людей к живым растениям вызывает ожог с последующим образованием пузырей. Животные могут только случайно поедать ясенец. Это растение так же является и лекарственным. Применять ясенец кавказский как лекарственное растение следует с осторожностью.



Dictamnus caucasicus

Борщевик Сосновского

Борщевик обладает огромной живучестью и быстро растет - в день на 10-12 см. Он достигает поистине гигантских размеров: высота - до 4 м, листья - до 1 кв.м.

Утром на листьях бывает столько росы, что можно вымыть руки. Дотронувшись до него, вы рискуете получить ожог 2 степени. Борщевик, который относится к семейству зонтичных, насчитывает около 70 видов. Наибольшее распространение получил борщевик Сосновского, который распространился повсеместно и превратился в природное бедствие, образовав местами заросли. Он чрезвычайно живуч: выдерживает заморозки до 10 градусов, стойкий к

я



Пастерная дикий, посевной

Обычное растение, встречающееся вдоль дорог и на открытых площадках само по себе не вредно. Однако сок дикого пастернака содержит химические вещества, которые в сочетании с солнечным светом вызывают серьезную кожную реакцию. Сок, находящийся в растении, содержит так называемые псоралены. В присутствии солнечного света они вызывают состояние, известное как фитофотодерматит. Жидкость поступает во время срезания или срывания растения. Кожная реакция проявляется в течение 24-48 часов с момента контакта с соком и солнечным светом.



Крапива жгучая

Крапива жгучая распространена в европейской части России, на Кавказе, в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Растет, как правило, по берегам рек и ручьев, в оврагах, на вырубках, лесных опушках. Встречается среди кустарников, в тенистых лесах. Часто можно увидеть крапиву, растущую как сорняк около жилья и дорог, в садах.



Крапива двудомная



Крапива жгучая



Лютик ядовитый

Лютик едкий (куриная слепота, луговая зоря, козелец, жемчужок). Этот вид лютика встречается чаще других.

Лютик ядовитый применяется как дезинфицирующее средство при заболеваниях кожи.



ЛЮТИК ЯДОВИТЫЙ



ЛЮТИК ЕДКИЙ